Yhtyneet Medix laboratoriot

Asiakastiedote
21/2017

12.4.2017.2017

Arvoisa asiakas,

Tarkempi menetelmä Anti-Müller hormonin (AMH) määritykseen

Anti-Muller hormoni
S -AMH KL 6310

Siirrämme S -AMH -tutkimuksen tehtäväksi alihankintalaboratorioon, jossa on käytössä aiempaa herkempi Rochen Elecsys -menetelmä. Menetelmä mittaa pitoisuuksia 0,03 µg/l asti. Muutoksen myötä tutkimuksen viitearvot, tekotiheys ja näytteen säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat.

Näyte 1 ml (minimi 0,3 ml) seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin lähetys pakastettuna.

Menetelmä Roche Elecsys® ECLIA.

Menetelmän tulostaso on keskimäärin 24 % matalampi kuin aiemmin käytetyn Elisa-menetelmän tulostaso, mikä tulee ottaa huomioon seurannassa olevien potilaiden kohdalla.

Menetelmä soveltuu AMH:n mittaamiseen Ferringin humaani rFSH-valmisteen, Rekovelle®, annostelua varten.

Tekotiheys 3 x vko

Vastausaika 3-5 arkipäivää

Viitearvot **Naiset:**

ikä	viitearvot µg/l
alle 13 v.	viitearvoja ei käytettävissä
13-19 v.	1,70 - 9,50
20-24 v.	1,22 - 11,70
25-29 v.	0,89 - 9,85
30-34 v.	0,58 - 8,13
35-39 v.	0,15 - 7,49
40-44 v.	0,03 - 5,47
45-50 v.	0,01 - 2,71
yli 50 v.	viitearvoja ei käytettävissä

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy
www.yml.fi Y-tunnus 2281070-9
Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
Puh. (09) 52 561
Faksi (09) 412 7053

Miehet:

ikä	viitearvot µg/l
alle 13 v.	10 - 130
≥ 13v.	1,40 - 11,60

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 12.5.2017 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Marika Havana
puh. 050 349 8446
marika.havana@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi