

GASTROPANEL® -TUTKIMUS

fP-GastPan (9172)

Tutkimuksella selvitetään ylävatsaoireita, mahalaukun limakalvovaurioita ja niihin liittyviä riskejä, sekä saadaan selville mahdollinen helikobakteeri-infektio ja hapoton maha.

Tutkimukseen valmistautuminen

Laboratoriossa otetaan verikoe, jota ennen tulee olla **4-10 tuntia syömättä, juomatta ja tupakoimatta**.

Ennen näytteenottoa on vältettävä tiettyjä lääkkeitä. **Lääkitysten keskeyttämisestä sovitaan aina lääkärin kanssa.**

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta

- Suolahapon erityksen estäjät: Cytotec, Famotidin Stada, Pepcid, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranixal, Zantac, Inside Brus, Ranitidin-Ratiopharm
- Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkeaineet: Constella, Gasprid, MCP-Ratiopharm, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orion, Motilium, Motilium Takeda, Motilium Tropfen, Primperan, Resolor, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma
- Antasidit: Balancid Novum, Magnesiummaito, Rennie, Natriumbikarbonat Recip
- Limakalvon suoja-aineet: Antepsin, Galieve, Gaviscon

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta

- Kuuriluonteiset antibioottihoidot
- Protonipumpun estäjät: Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanrec, Lansoprazol Krka, Lansoprazol Mylan, Lansoprazole, Lantil, Lanvone, Losec, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantopratsoli Sun, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pariet, Rabeprazol Krka, Somac, Somac Control, Zolt.

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta

- Helikobakteerin häätöhoidot: Helipak A, Helipak K

Jos edellä mainittujen mahalaukun eritykseen vaikuttavien lääkkeiden käyttöä ei jostain syystä pystytä lopettamaan, tulisi asiasta mainita lähetteessä.

Näytteen mukana on toimitettava tieto helikobakteerin häätöhoidosta, närästys- oireista ja liikkahappoisuus- ja särkylääkkeiden käytöstä. Ilmoitetaan laboratorioon, jos ohjeista on poikettu.