

GASTROPANEL® -UNDERSÖKNING

fP-GastPan (9172)

Undersökningen utreder symptom i övre delen av magen, skador i magsäckens slemhinna och risker samhörande med dessa samt möjlig helicobacter-infektion och låg syra i magen.

Förberedelser inför undersökningen

Vid laboratoriet tas ett blodprov. Patienten skall låta bli att **äta, dricka eller röka 4-10 timmar före blodprovet.**

Vissa läkemedel bör undvikas före blodprovet. **Om avbrytandet av medicineringen konsulteras alltid en läkare.**

Läkemedel som inte får tas ett dygn (1) före undersökningen

- Magsyrehämmande läkemedel: Cytotec, Famotidin Stada, Pepcid, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranixal, Zantac, Inside Brus, Ranitidin-Ratiopharm
- Läkemedel som inverkar på tarmens motilitet: Constella, Gaspid, MCP-Ratiopharm, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orion, Motilium, Motilium Takeda, Motilium Tropfen, Primperan, Resolor, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma
- Antasider: Balancid Novum, Magnesiummaito, Rennie, Natriumbikarbonat Recip
- Läkemedel som skyddar slemhinnan: Antepsin, Galieve, Gaviscon

Läkemedel som inte får tas två (2) veckor före undersökningen

- Antibiotikakurer
- Protonpumpshämmare: Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanrec, Lansoprazol Krka, Lansoprazol Mylan, Lansoprazole, Lantil, Lanvone, Losec, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantopratsoli Sun, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pariet, Rabeprazol Krka, Somac, Somac Control, Zolt.

Läkemedel som inte får tas fyra (4) veckor före undersökningen

- Behandling för avhysning av helicobacter: Helipak A, Helipak K

Om det inte är möjligt att avsluta användningen av ovan nämnda läkemedel som inverkar på utsöndringen i magsäcken, borde detta omnämnas i remissen.

Information om avhysningsbehandling mot helicobacter, om halsbränna och om användning av läkemedel mot hög magsyra samt om användning av värkmedicin bör bifogas till provet. Man bör meddela laboratoriet om man avviker från anvisningarna.