

KIHOMADOT, ENTEROBIUS VERMICULARIS F -Enve-O (2053)

Kihomatoinfektion tutkiminen oireiden perusteella (peräaukon kutina) tai epäiltäessä epidemiologista tartuntaa.

Näytteenottovälineet

- Näytteenottotikku
- Kierrekorkillinen näyteputki
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip®)

Näytteenotto

Näyte suositellaan otettavaksi kolmena (3) eri päivänä. Näyte otetaan heti aamulla heräämisen jälkeen ennen ulostamista ja peseytymistä.

1. Vanutikku kostutetaan vesijohtovedellä.
2. Kostutetulla vanutikulla hangataan voimakkaasti peräaukon suuta ja poimuja. Hankaamisen jälkeen vanutikku työnnetään hetkeksi peräaukkoon noin 0,5 cm syvyyteen.
3. Tikku laitetaan näyteputkeen. Tikku katkaistaan niin lyhyeksi, että korkin saa kunnolla kiinni.

Kiinnitetään laboratorion saatu valmis tai itse täytetty nimitarra näyteputkeen. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.

Säilytys ja kuljetus

Näyte säilytetään näytteenoton jälkeen jääkapissa (2-8°C).

Näyte toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä mahdollisimman pian näytteenotto-päivänä.

Laboratorioon ilmoitetaan oireet ja niiden kesto sekä mahdolliset aiemmat hoidot.